

臺北市立聯合醫院陽明院區 8A 病房

護生臨床教學計畫書

98..02.26 制定
99.12.31 一修
100.05.10 二修
102.08.05 三修
103.08.29 四修
105.09.02 五修
108.01.01 六修
112.05.30 七修
113.05.31 八修
113.06.28 九修

一、實習指導老師

姓 名	盧麗華
聯 絡 電 話	02-28353456 分機 6812-3
Email address	lulihua86@gmail.com

二、8A 病房簡介

單 位 特 性	內科 36 床
單 位 主 管	蕭蘭芳護理長
地 址	臺北市士林區雨聲街 105 號
單 位 電 話	02-28353456 分機 6815
上 班 時 段	白班 07:30-15:30 (7:15 以前抵達護理站)

三、8A 病房使用藥物注意事項

QD : 09	BID : 09-17	TID : 09-13-17	QID : 9-13-17-21
QID Ac : 7-11-16-21	Q12h : 9-21	Q8h : 01-9-17	Q6h : 6-12-18-24
◎蒸氣吸入給藥配置方法：依醫囑給藥			
◎所有給藥包括大量點滴注射，均需先核對醫囑，並依據電腦 HIS 系統核對才能給藥。			
◎個案注射大量點滴時，每小時察看正確滴數，並控制好每班應給之量。			
◎交接班前務必檢查靜脈點滴處是否正常，要注意有無紅腫及順暢。			
◎靜脈點滴滴數 30cc/每小時以下，需使用 IV pump。			
◎給藥及執行任何技術均需在學姊監督下執行。			

四、8A 病房常用藥物

8A 病房 GI 的常用藥物

藥 名	作 用	副作用
Anvita	維他命 B1. B6. B12 缺乏治療劑	噁心、舌炎、腹瀉
Famotidine	消化性潰瘍治療劑	腹瀉
Mopride	促消化劑	腹瀉、腹痛
Mosapulin (Mosapride)	促腸蠕動	下痢, 軟便, 口渴及倦怠感
Buscopan	治療尿路胃腸痙攣疼痛	口渴、便秘

Bisadyl	緩瀉劑	腹痛、腸胃不適感、腹瀉
Domtoo	消化劑和利膽劑	腹痛
Duphalac	緩瀉劑	噁心、腹痛、下瀉
Enzyme	促消化劑	腹痛
Ferich	鐵劑	便秘
Gowell	鋁鎂混合制酸劑	噁心
Loperamide	止瀉劑	便秘、噁心
Luckyhepa	強肝劑，治療肝疾病	噁心、嘔吐
Kascoal	制酸劑抗發脹劑，解除胃腸脹氣	腹瀉
Lac-B	消化劑及緩瀉劑，含益生菌	
Mgo	軟便、制酸劑	腹瀉
Nexium	消化性潰瘍治療劑	噁心、頭痛、脹氣
Novamin	止吐劑也可當精神安定劑	口乾、便秘
Primperan	消化劑和利膽劑	頭痛、臉潮紅、血壓上升
PanHo	消化性潰瘍治療劑	噁心、頭痛
Smecta	止瀉劑	便秘
Sennapur	軟便劑	腹痛、腹瀉
Strocaïne	制酸劑，局部麻醉作用	便秘、食慾下降
Takepron	制酸劑治療消化性潰瘍	眩暈、疲倦、腹瀉
Folic Acid	預防及治療貧血	噁心、味覺不佳、皮膚潮紅
Pantoloc (Pantoprazole)	抑胃酸分泌。治胃或十二指腸潰瘍及逆行性食道炎	頭痛、輕微腹瀉
Biozole (Omeprazole)	氫離子幫浦抑制劑胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群	頭痛，胃腸道的影響
Sheco Granules(Bromhexine)	祛痰及減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性	腹痛、噁心、嘔吐
Calcium carbonate	可用於緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指	腹脹、打嗝等，此外便秘或腹瀉

	腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多	
Biozole (Omeprazole)	氫離子幫浦抑制劑胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群	頭痛，胃腸道的影響
Luckyhepa (Silymarin)	肝臟疾病之佐藥	可能有胃腸道不適等現象
Uroso (Ursodeoxycholic Acid)	膽固醇系膽結石之溶解、原發性膽道肝硬化(primary biliary cirrhosis, PBC)之肝功能改善	可能有腹痛、胃痛、噁心、嘔吐等現象
Bfluid 1000ml(Amino+Glu+Eletro)	手術前後之營養補給、低蛋白血症、消化道潰瘍、營養障礙之補給	血管痛、靜脈炎
Sinvomin (Metoclopramide)	預防嘔吐，逆流性消化性食道炎，糖尿病引起之胃腸蠕動異常	可能有水腫、鎮靜、嗜睡、震顫等現象
Through (Sennoside A+B)	緩解便秘	輕微腸胃不適如絞痛或抽筋似疼痛、腹瀉、流失水分及電解質
Nolidin (Butinolin +Al(OH) +CaCO ₃)	胃酸過多、胃炎、十二指腸炎、胃及十二指腸潰瘍所引起之痙攣及疼痛。	便秘、噁心
Scrat(Sucralfate)	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、食道潰瘍、逆流性食道炎	便秘、輕微腹痛、脹氣、口乾、頭暈等

8A 病房 CHEST 的常用藥物

藥名	作用	副作用
Aminophylline	支氣管擴張	噁心嘔吐、心跳加快
Berotec	支氣管擴張	心悸、口乾、頭痛、眩暈
Bisolvon	祛痰劑痰液溶解劑	噁心、食慾不振
Combivent	支氣管擴張	咳嗽、口乾
Colin	鎮咳劑	口乾、嗜睡
Codeine	鎮咳劑、麻醉性止痛劑	食慾下降、頭暈、噁心，長期使用會成癮
Actein	祛痰劑痰液溶解劑	胃部刺激、皮膚過敏
Flucil	祛痰劑痰液溶解劑	噁心、發疹、口炎

Eufan	鎮咳劑	過敏、嘔吐、目眩
Medicon-A	鎮咳劑	過敏、嘔吐、目眩
Medika	鎮咳劑	便秘、頭痛、頭暈、嗜睡、噁心、嘔吐、胃痛
Meptin	支氣管擴張	心悸、頭痛、噁心
Brown Mixture	鎮咳劑	胃不適、發疹、腹瀉
Compesolon	腎上腺皮質激素，有消炎抗過敏、抗氣喘	消化性潰瘍、腸胃出血
Regrow	鎮咳劑	噁心、嘔吐、食慾不振
Thoin	支氣管擴張	頭痛、震顫、心悸
Broen-c	消炎消腫	噁心、嘔吐
Relung (學名 Sildenafil)(Viagra，威而鋼)	肺治動脈高血壓(可預防高山症，等同是低劑量的威而鋼)	出血、皮疹肝功能異常。
Berodual N(Ipratropium/Fenoterol), 1, puff, PRN, INHL	預防和治療支氣管氣喘、阻塞性/慢性支氣管炎、氣腫和伴支氣管痙攣之肺支氣管障害	頭痛、暈眩、緊張、心跳過速、心悸、口乾、發生困難、咳嗽、局部刺激

8A 病房 TB 的常用藥物

藥名	作用	副作用
EMB (ethambutol)	抗肺結核用藥	視神經炎、尿酸增加
INAH (isoniazid)	抗肺結核用藥	肝毒性、周邊神經炎
Mide (pyrazinamide)	抗肺結核用藥	噁心、嘔吐、肝毒性
RIF (rifampicin)	抗肺結核用藥	腹不適、胎兒畸形 (故孕婦禁用)

8A 病房 NEPHO 的常見藥物

藥名	作用	副作用
Kalimate	鉀離子阻斷劑，治療高血鉀	低血鉀、鈉滯留、便秘
Colchicine	治療痛風、高尿酸血症	噁心、腹瀉、肝指數上升

Radi-k	鉀離子補充劑	噁心、嘔吐、腹瀉
K-Glu(口服)	鉀離子補充劑	噁心、嘔吐、腹瀉

8A 病房新陳代謝的常用藥物

藥名	作用	副作用
Amaryl	降血糖劑	低血糖
Actosmet	降血糖劑	心衰竭慎用、腎功能不良不建議使用
Kludone	降血糖劑	嘔吐、噁心、暈眩
Januvia	降血糖劑	腸胃不適
Novonorm	降血糖劑	腸胃不適、皮膚過敏
Amamet	降血糖劑	腎功能不良不建議使用
GalvusMet	降血糖劑	腎功能不良慎用
Metformin	降血糖劑	低血糖、腹瀉
Humulin-R	短效胰島素	低血糖
Humulin-N	中長效胰島素	低血糖、蕁麻疹
Lantus	中長效型胰島素	低血糖、蕁麻疹
NovoMix	中長效型胰島素	低血糖、蕁麻疹
Toujeo	長效型胰島素	低血糖、局部性過敏反應、低血鉀
Feburic (Febuxostat)	慢性痛風、因化療發生 腫瘤溶解症候群的高尿酸血症	可能有腹痛、胃痛、噁心、嘔吐等現象
ACTOS (Pioglitazone HCl),	第二型 DM	上呼吸道感染、頭痛、水腫、肌肉痛。

8A 病房 CV 的常見藥物

藥名	作用	副作用
Genopril	抗高血壓劑	疲倦、噁心、頭痛、暈眩
Coaprovel	抗高血壓劑	皮膚疹、暈眩、痙攣
Concor	抗狹心症藥物	頭痛、面潮紅、噁心、暈眩
Exforge	抗高血壓劑	頭痛、體位性低血壓、眩暈
Spiron	利尿劑	男性女乳症、蕁麻疹
Anginar	抗狹心症藥物	頭痛、面潮紅、噁心、暈眩
Apresoline	抗高血壓劑	心悸、頭痛、胃腸障礙、眩暈
Aprovel	抗高血壓劑	口乾、噁心、頭痛、皮膚紅疹
Adrenaline	低血壓及休克治療	心悸、頭痛、面潮紅
Cartil	抗狹心症藥物	徐脈、眩暈、頭痛、面潮紅
Cordarone	抗心律不整劑	血壓降低、頭痛、心跳緩慢
Coxine-SR	抗狹心症藥物	血壓降低
Doxaben	抗高血壓劑	疲倦、頭痛、暈眩
Dilatrend	抗狹心症藥物	血壓降低、頭痛、暈眩
Imdur	抗狹心症藥物	徐脈、眩暈、頭痛、面潮紅
Euclidan	末梢血管擴張劑	眩暈、倦怠、潮紅、頭痛
Fluitran	利尿劑	噁心、面潮紅
pletaal	改善末梢循環	出血、腹瀉、頭暈
Hytrin	抗高血壓劑	暈眩、頭痛、口乾、腸胃不適
Isoptin	抗心律不整劑	低血壓、疲倦、頭痛、暈眩
Inderal	抗高血壓、抗心律不整、抗狹心症藥物	噁心、腹瀉、倦怠、徐脈
Isormol	抗狹心症藥物	低血壓
Lanoxin	強心劑	噁心、嘔吐、徐脈
Levophed	擬交感神經劑、升壓劑	頭痛、眩暈、徐脈、心悸

Lipitor	降血脂劑	背痛、虛弱、過敏、頭痛
Lovasta	降血脂劑	胃腸不適、頭痛
Mannitol	利尿劑	暈眩、頭痛、口渴、噁心
Aldactone	保鉀型利尿劑	胃腸不適、低血壓
Nobar	抗高血壓劑	低血壓、噁心、面潮紅、暈眩、頭痛、便秘、水腫
Bokey	抗血栓	胃出血、噁心
Aspirin	退燒、止痛、抗血栓	胃出血、噁心
Rasitol(iv) uretropic (po)	(排鉀型)利尿劑	心跳加快、失眠、胃腸不適、
Sancin	抗狹心症藥物	暈眩、頭痛、發疹、腸胃不適
Syscor	抗高血壓劑	頭痛、面潮紅
Trandate	抗高血壓劑	體位性低血壓
Amilo	抗高血壓劑	低血壓、暈眩、頭痛、心悸
Amtrel	抗高血壓劑	低血壓
Xylocaine2%	抗心律不整劑	心搏過慢、血壓降低、眩暈
Blopress	抗高血壓劑	低血壓
Rhynorm (propafenone)	降壓藥. 治心律不整	食慾不振、噁心、脹氣、便秘、口乾、口苦、口麻、姿勢性低血壓
Lixiana (Edoxaban)	治深層靜脈栓塞及肺栓塞的新型抗凝血劑	出血、皮疹. 肝功能值異常。
Midil	降壓藥	低血壓、多毛症、體液滯留、高鈉血症
NorVAsC (Amlodipine)	高血壓、心絞痛	頭痛、水腫、疲倦、噁心、臉部潮紅和暈眩
Aprezin (Hydralazine)	治高血壓	頭痛、心臟不適、水腫、食慾不振、腹瀉
Carvedilol	治療高血壓、鬱血性心衰竭、心肌梗塞	暈眩、頭痛、疲倦、心跳過慢、姿勢性低血壓和罕見的暈厥
Forflow (PENTOP)(Pentoxifylline)	末梢血管循環障礙	噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈、皮膚潮紅
Const-K Extended-Release (Potassium	治缺鉀	噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、腸胃脹氣

chloride)		
Calglon(Calcium Gluconate)	治缺鈣	滲漏引起炎症、硬結、壞疽
Mag. Sulfate	治缺鎂	潮紅、低血壓、血管擴張。
Diovan (Valsartan)	治高血壓、心衰竭	頭痛、暈眩、咳嗽、腹瀉、疲勞等
Perdipine l(Nicardipine)	治高血壓	頻脈、心悸、潮紅、倦怠感、頭痛、體溫上升、尿量減少
Uretropic (Furosemide)	治水腫及高血壓	噁心、食慾減退、多尿、暈眩、光敏感、高尿酸
Foliromin	治療貧血、補充鐵質	噁心、嘔吐、食慾不振，或腹部飽脹感
Limadol(Tramadol)	嚴重之急慢性疼痛	發汗、眩暈、噁心、嘔吐、口乾及疲勞
Lacoxb(Etodolac)	風濕性關節炎、骨關節炎	可能有消化不良、腹痛、頭暈、皮膚紅疹等現象
Zulitor (Pitavastatin)	原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常	發疹、搔癢、倦怠、肌肉疼痛、頭痛、腹痛
PlaVIX (Clopidogrel)	預防血栓形成	胃腸不適、頭痛、肌肉酸痛、不正常出血
Perdipine (Nicardipine)	降血壓藥	顏面潮紅、倦怠感、週邊水腫、頭痛、口乾、噁心、紅疹、低血壓
Betaloc ZOK (Metoprolol)	高血壓、心絞痛、慢性心衰竭	心跳遲緩、手腳冰冷、心悸、頭痛、倦怠、胃腸不適、失眠、搔癢、做夢
Pronolol (Propranolol)	狹心症/上心室不整律/心室心搏過速/原發及腎性高血壓/偏頭痛/控制原發性震顫/控制焦慮性心搏過速/甲狀腺毒症輔助/親鉻細胞瘤	可能有手腳冰冷、心跳徐緩等現象
Dipyridamole	血管擴張，抑制血小板凝集。治狹心症	噁心、嘔吐、頭痛、暈眩、潮紅
Livalo (Pitavastatin)	原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常	噁心、頭痛、胃痛、頭暈、心灼熱、昏睡、便秘、腹痛
Herbesser(Diltiazem)	狹心症、輕度至中度之本態性高血壓	可能有頭痛、水腫、心跳變慢等現象
Multaq (Dronedarone)	心房纖維顫動或心房撲動	可能有皮疹、腹瀉、噁心、嘔吐等現象
Xarelto(Rivaroxaban)ta rry stool	抗凝血劑，防止血栓形成	出血
Aprezin (Hydralazine)	高血壓	頭痛、心臟不適、水腫、食慾不振、腹瀉

8A 病房 NEURO 的常見藥物

藥名	作用	副作用
Alpraline	抗焦慮劑	嗜睡、震顫、眩暈、噁心
Calmday	抗焦慮劑	嗜睡、眩暈、噁心
Aleviatin	抗心律不整劑、抗痙攣劑	眩暈、運動失調、頭痛
Befon	骨骼肌鬆弛劑	頭痛、噁心、便秘、低血壓
Diphenidol	鎮暈劑	胸部灼熱感、口乾、出疹
Depakine	抗癲癇劑	抑制血小板凝集、血小板減少
Anzepam	抗焦慮劑	口渴、食慾不振、腸胃不適
Noopol	腦代謝改善劑	
Normabrain	腦代謝改善劑	
Madopar	治療帕金森氏症	食慾喪失、噁心、嘔吐
Clonopam	抗癲癇劑	口乾、嗜睡、疲倦、噁心、嘔吐
Relax	骨骼肌鬆弛劑	頭暈、頭痛
Eszo	鎮靜安眠	頭暈
Genclone	鎮靜安眠	頭暈
Ebixa	治療阿茲海默症	頭痛、眩暈、高血壓
Xanax (Alprazolam)	焦慮狀態	思睡、倦怠、失憶、運動失調、激動、抑鬱、眩暈、口乾
Seroquel(Quetiapine)	精神分裂症，雙極性疾患之躁症發作	暈、嗜睡、口乾、輕微無力、便秘、心搏過速、姿勢性低血壓、消化不良
Donepezil(Aricept)	治療阿茲海默症	失眠、噁心、嘔吐、食慾降低、頭痛、暈眩、腹瀉、肌肉痙攣
Eurodin(Estazolam)	治療失眠	嗜睡、暈眩、疲倦、頭痛、噁心、皮膚癢、情緒不穩、暫時性的失憶
Syntam (Piracetam)	對腦血管障礙及老化所引起的智力障礙、皮質性陣發性抽搐之輔助療法	發疹、搔癢、倦怠、肌肉疼痛、頭痛、腹痛

Risperdal (Risperidone)	治療精神疾病相關的症狀	可能有動作遲緩，坐立不安，視力模糊，月經週期改變，手發抖等現象
Anxicam(Lorazepam)	焦慮狀態	可能有嗜睡、暈眩、頭痛、耳鳴等現象
Mocolax (Phenprobamate)	筋痙攣、筋硬直等肌肉異常緊張之緩解	發疹、睡意、暈眩、倦怠感、噁心
Wellbutrin (Bupropion)	治療情緒低落及相關症狀	可能有頭暈、口乾、噁心等現象
ZoloFT (Sertraline)	情緒改善劑	可能有昏昏欲睡、皮膚紅疹、皮膚癢等現象
lomborexant	失眠症	嗜睡
Methycobal(Mecobalamin)	末梢性神經障礙	胃部不適、食慾不振、噁心、腹瀉、發疹
Switane (Trihexyphenidyl) (Benzhexol)	抗巴金森症藥物	便秘，流汗減少，昏昏欲睡，口乾
Genclone (Zopiclone)	抗精神病藥物	焦慮或坐立不安、意識混淆、腳步不穩
Wecoli (Bethanechol)	手術後、產後或神經性膀胱張力減低之尿儲留	能有腹瀉、流涎、尿急等現象。
Akinfree (Biperiden)	帕金森氏症	偶有口乾、精神激昂、視力模糊、嗜睡、姿勢性低血壓、便秘、行為障礙
Binin-U (Haloperidol)	躁病、思覺失調症等精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病	可能有頭痛、水腫、心跳變慢等現象
MIRtapine (Mirtazapine)	失眠憂鬱症	疲倦、肌痛、心跳過速、口腔感覺異常、嗜睡、血清素症候群（症狀如顫抖、意識混亂、肌肉僵硬、體溫升高）、頭痛及下痢等。
Fluzepam (Flunitrazepam)	失眠	疲倦、肌肉無力、嗜眠
Keppra(Levetiracetam)	治療癲癇症。	可能有嗜睡、無力感等現象。
Oxazolam	緩解焦慮 及緊張感	嗜睡、暈眩、疲倦、頭痛、噁心、皮膚癢、情緒不穩

8A 病房 INFECTION 的常見藥物

藥名	作用	副作用
Acetal(Acetaminophen)	退燒、止痛	噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、發疹、發紅
Cetazine(Ceftazidime) 稀釋後瓶內壓力大，所以要先抽瓶內氣體	頭孢子菌抗生素、對多種乙內醯胺有抵抗力、對革蘭氏陽及陰性細菌有效	胃腸道副作用、注射部位局部皮膚反應、過敏反應等
Targocid(Teicoplanin)	葡萄球菌感染所致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血症、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎。	局部發紅、疼痛、血栓性靜脈炎、潮紅、發癢、腹瀉、嗜伊紅血球增多
Brosym(Cefoperazone/Sulbactam)	感受性細菌所引起的感染	腹瀉、發疹、發燒、維他命 K 缺乏症
CeXitin (Cefoxitin)	抗生素—頭孢子菌類	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症
Morcasin (SMX/TMP)	革蘭氏陽性菌及陰性菌所引起之呼吸道、泌尿道、腸胃道感染症。	光敏感、腹瀉、頭暈、食慾缺乏、噁心或嘔吐、疲倦
Culin (Imipenem/Cilastatin)	對 imipenem 具有感受性之革蘭氏陰性菌、陽性菌感染症	噁心、嘔吐、下痢、注射部位疼痛、靜脈炎
Flurbi /Patch(Flurbiprofen)	變形性關節症、肩關節周圍炎、肌腱鞘炎、腱周圍炎、上腕骨上髁炎、肌肉痛、	發疹、潮紅、搔癢
Lyrica (Pregabalin)	成人局部癲癇的輔助治療、帶狀疱疹後神經痛。纖維肌痛、糖尿病周邊神經病變、脊髓損傷所引起的神經性疼痛	有眩暈、水腫、肌肉痛、運動失調、眼球震顫等現象
Lexotan (Bromazepam)	腫脹、疼痛等諸症狀的鎮痛、消炎	可能有腳步笨拙或不穩，頭暈，昏昏欲睡，口齒不清等現象
Mepem (Meropenem)	對MEROPENEM具有感受性之細菌引起之感染症	可能有皮疹、腹瀉、噁心、嘔吐等現象
Cefuroxime (Cefuroxime)	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症	可能有腸胃不適的現象
Tatumcef (Ceftazidime) 會起泡(會起泡，所以先放適量稀釋液，滴注液面先擠好，再加藥)，稀釋後瓶內壓力大，所以要先抽瓶內氣體	CEFATAZIDIME是殺菌性頭孢子菌抗生素、對多種乙內醯胺每有抵抗力、並對廣範圍的革蘭氏陽性菌及陰性菌有效。	可能有皮疹、腹瀉、噁心、嘔吐等現象
Zavicefta	複雜性腹腔內感染、複雜性泌	可能有頭痛、頭暈、噁心/嘔

(Ceftazidime/Avibactam) +100ccDW 滴住 2 小時, 稀釋後瓶內壓力大, 所以要先抽瓶內氣體	尿道感染(包括腎盂腎炎)、院內感染型肺炎(包括呼吸器相關肺炎)	吐、腹痛、腹瀉、等副作用
Pipe&Tazo(Pipe/Tazo=4/0.5) 很難溶解	對 Piperacillin 具有感受性、或對其具抗藥性但對 tazobactam 有感受性之 beta-lactamase 產生菌株引起中至嚴重感染	可能有腹瀉、噁心、失眠、皮膚癢等現象
AmoClav (Amo-1000+Clavu-200)放稍久一點會變褐色, 所以水要多一點, 將 bag 沖乾淨	葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症	可能有皮疹、噁心、嘔吐、腹瀉等現象
Veklury(Remdesivir)Covid	重度新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 感染症	噁心、發燒、嘔吐
Amsulber (AMP/SUL)	鏈球菌、葡萄球菌、大腸桿菌、克雷氏菌、沙雷氏菌、流行感冒嗜血桿菌、陰性變形桿菌屬等引起之感染症	可能有皮疹、腹瀉、噁心、嘔吐等現象
Teiyu 會起泡, 所以先放適量稀釋液, 滴注液面先擠好, 再加藥	葡萄球菌感染所導致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎、敗血症、軟組織感染、腸炎、梭狀桿菌感染所致之假膜性結腸炎	發燒、下痢、皮疹、白血球減少
Tecopin 會起泡(會起泡, 所以先放適量稀釋液, 滴注液面先擠好, 再加藥)	葡萄球菌感染所導致之心內膜炎、骨髓炎、肺炎等	血栓靜脈炎, 下痢, 眩暈, 白血球減少. 發燒(1.3%)
Colistin 腎毒性	使用於一般抗生素無效, 且具多重抗藥性之革蘭氏陰性菌之嚴重感染。	腎毒性、頭暈、頭痛、發燒、運動失調、胃腸不適、紅疹、呼吸抑制

五、8A 常見疾病診斷及縮寫

科別	英文縮寫	英文全文	中文
消化內科 Gastrointestinal (GI)	GERD	Gastroesophageal Reflux Disease	胃食道逆流疾病
	GU	Gastric ulcer	胃潰瘍
	UGI bleeding	Upper gastrointestinal bleeding	上腸胃道出血
		Gastric cancer	胃癌
	PUD	Peptic ulcer disease	消化性潰瘍疾病
	DU	Duodenal ulcer	十二指腸潰瘍
		Acute pancreatitis	急性胰臟炎
		Hepatitis	肝炎
		Cholecystitis	膽囊炎
		Liver cirrhosis	肝硬化
		Liver abscess	肝膿瘍
	HCC	Hepatic cell carcinoma	肝細胞癌
		Hepatoma	肝癌
		Ileus	腸阻塞

	LGI bleeding	Lower gastrointestinal bleeding	下腸胃道出血
		Hemorrhoid	痔瘡
		Anal abscess	肛門膿瘍
感染科 infection(INF)		Cellulitis	蜂窩性組織炎
	FOU	Fever of unknown	不明熱
		Sepsis	敗血症
胸腔內科 Chest Medicine (CHE)		Acute bronchitis	急性支氣管炎
		Asthma	氣喘
	PN	Pneumonia	肺炎
		Pleural effusion	肋膜積水
		Acute pulmonary edema	急性肺水腫
		Spontaneous pneumothorax	自發性氣胸
	COPD	Chronic obstructive pulmonary disease	慢性阻塞性肺疾病
	Pul.TB	Pulmonary tuberculosis	肺結核
		Lung cancer	肺癌
		Respiratory failure	呼吸衰竭
	ARDS	Adult Respiratory Distress Syndrome	成人呼吸窘迫症候群
新陳代謝科 Metabolism (META)	IDDM	insulin-dependent diabetes mellitus	胰島素依賴性糖尿病
	NIDDM	non-insulin-dependent diabetes mellitus	非胰島素依賴性糖尿病
	DM	Diabetes Mellitus	糖尿病
		Hypoglycemia	低血糖
		Hyperglycemia	高血糖
	DKA	Diabetic Ketoacidosis	糖尿病性酮酸中毒
	HHNK	Hyperglycemic Hyperosmotic Nonketotic Coma	高血糖、高滲透、非酮性昏迷
		Diabetic neuropathy	糖尿病性神經病變
		Diabetic nephropathy	糖尿病性腎臟病變
		Diabetic retinopathy	糖尿病性視網膜病變
		Hyperthyroidism	甲狀腺機能亢進
		Hypothyroidism	甲狀腺功能低下
		Hyperparathyroidism	副甲狀腺機能亢進
		Hypoparathyroidism	副甲狀腺功能低下
		Hyponatremia	低血鈉症
		Hypokalemia	低血鉀
		Hyperkalemia	高血鉀
		Hyperlipidemia	高血脂
腎臟內科 Nephrology (Nephro)	UTI	urinary tract infection	泌尿道感染
	APN	Acute pyelonephritis	急性腎盂腎炎
	CGN	Chronic glomerulonephritis	慢性腎絲球腎炎
	ARF	Acute renal failure	急性腎衰竭
	CRF	Chronic renal failure	慢性腎衰竭
		Ureteral stone	輸尿管結石
		Renal stone	腎結石
	BPH	Benign prostatic hypertrophy	攝護腺肥大
		Nephrotic Syndrome	腎病症候群
		Hydronephrosis	腎水腫
		Uremia	尿毒症
	ESRD	End-Stage Renal Disease	末期腎臟病
神經內科 Neurologic	CVA	Cerebral Vascular Accident ;	腦血管意外
		stroke	中風

(Neuro.)	TIA	Transient Ischemic Attack	暫時缺血性發作
		Cerebral Embolism	腦栓塞
		Cerebral Thrombosis	腦血栓
		Cerebral Infarction	腦梗塞
	MCA Infarction	Middle Cerebral Artery Infarction	中大腦動脈梗塞
	ICH	Intracranial Hemorrhage	顱內出血
	SAH	Subarachnoid Hemorrhage	蜘蛛膜下腔出血
	SDH	Subdural Hemorrhage	硬腦膜下出血
		Thalamic Hemorrhage	丘腦出血
		Seizure	抽搐
		Syncope	暈厥
		Epilepsy	癲癇
		Vertigo	眩暈
		Parkinsonism	帕金森氏症
		Meningitis	腦膜炎
		Brain Tumor	腦瘤
		Brain Concussion	腦震盪
		Brain Contusion	腦挫傷
	IICP	Increased Intracranial Pressure	顱內壓上升
血液科(Hema.)		Anemia	貧血
	SLE	Systemic Lupus Erythematosus	紅斑性狼瘡
	RA	Rheumatoid arthritis	類風濕性關節炎
心臟內科 Cardiovascular (CV)	HTN	Hypertention	高血壓
	HCVD	Hypertensive cardiovascular disease	高血壓性心血管疾病
	CAD	Coronary artery disease	冠狀動脈疾病
	ACS	Acute coronary syndrome	急性冠心症候群
	IHD	Ischemic Heart Disease	缺血性心臟病
		Bradycardia	心搏過緩
	A-V Block	Atrio-Ventricular Block	房室傳導阻滯
	Af	Atrial Fibrillation	心房纖維顫動
	DVT	Deep vein thrombosis	深部靜脈栓塞
		Angina pectoris	心絞痛
	A. M. I.	Acute myocardial infarction	急性心肌梗塞
	CHF	Congstive heart failure	充血性心衰竭
		Aortic dissection	主動脈剝離

六、8A 常見醫學術語

med (Medical)	內科	ward routine	病房常規	Admitted at	入院時間
Local Medical Doctor 當地開業醫					
AAD / Against-advise discharge 自動出院		MBD / May be discharge 許可下出院		admission note 入院摘要	
Hx / History 病史		progress note 病程記錄		AST As tolerate 病人可接受之程度	
Order 醫囑		On call 等(手術或檢查)通知		Permit 同意書	
Px / Perscription 處方		OP / Operation 手術		Chart 病歷	
OPD / Outpatient department 門診		OR / Operative room 手術室		Consult 會診	
PCT、PST/Penicillin (skin) test 盤尼西林皮膚測試		PE / Physical examination 身體評估		Pain 疼痛	
Positive 正、陽性		p() / Post, after 在…之後		Bedside 病人單位	

Neg / Negative	負、陰性	Remove	移除	Morning care	晨間護理
St. / Statim, immediately	立即	Stable	穩定	LMD / Local medical doctor	開業醫
fever routine	發燒常規	BW (body weight)	體重	expired date	有效期
C/O / Chief complain	主訴、抱怨	Dx / Diagnosis	診斷	R/O (rule out)	疑似
DC / Discontinue	停止	Hold	暫停	NPO (non per oral)	禁食
CM / Coming morning	明晨	gtt / Gutta, drop	滴	F/U (follow-up)	追蹤
Amp / ampule	安瓿	Ice pillow	冰枕	D/W / Distilled water	無菌蒸餾水
Vial	小藥瓶	supp. (suppository)	肛門栓劑	IVF / Intravenous fluid	靜脈注射液
Abnormal	不正常	N/S / Normal saline	生理食鹽水	SC / subcutaneous	皮下注射
Normal	正常	G/W / Glucose water	葡萄糖水	CD / Change dressing	換藥
I/O/Intake and output	攝入與排出	O2 mask	氧氣面罩	gm / gram	公克
coma	昏迷	On liquid diet	流質飲食	mg / milligram	千分之一公克，毫克
unconsciousness	無意識	On soft diet	軟質飲食	MN / Midnight	午夜 12 點
Blood sugar	血糖	O2 nasal /cannula	氧氣鼻導管	Headach	頭痛
MAR / Medication administration record	服藥記錄	chest physiotherapy	胸腔物理治療	ABG/Arterial blood gases	動脈血氧分析
V/S (vital sign)	生命徵象	weakness	衰弱	Bacteria	細菌
BT (body temperature)	體溫	Platelet	血小板	Virus	病毒
PR(Pulse rate)	脈搏速率	Hemorrhage	出血	Abd / abdomen	腹部
HR / Heart rate	心跳速率	bleeding	流血	bowel sounds	腸音
RR / Respiratory rate	呼吸速率	hematoma	血腫	Appetite	食慾
Resp / Respiratory	呼吸的	irrigation	沖洗	Feeding	餵食
Sys / systolic	收縮壓	Leakage	滲漏	Soft	柔軟
Dia / diastolic	舒張壓	CD / Chang dressing	換藥	Fullness	腹脹
Breathing sound	呼吸音	Pedal edema	足部水腫	Distension	腹脹
moist rales	濕囉音	Blood	血液	nausea	噁心
Stridor	哮鳴音	Urine	尿	Vomiting	嘔吐
wheezing	哮鳴音	Stool	糞便	coffee ground	咖啡渣嘔吐物
Cough	咳嗽	Sputum	痰	Tarry stool	黑焦油樣糞便
Dyspnea	呼吸困難	U/A/Urine analysis	尿液分析	Diarrhea	腹瀉
steam inhalation	蒸氣吸入	U/C /Urine culture	尿液培養	Dehydration	脫水
Suction	抽吸	Discharge	分泌物	ascites	腹水
Infection	感染	Ischemia	缺血	decompression	減壓
Chillness	寒顫	jaundice	黃疸	Warm water bath	溫水拭
Pus	化膿	Warm packing	熱敷	Foley	尿管

七、8A 病房常見檢查

英文	中文
EEG(electroencephalogram)	腦電波圖
Chest AP(PA)Xray	胸部 x 光
CT (computerized tomography) scan: Abdominal Renal Brain	電腦斷層掃描:腹、腎、腦
CNCT (CT without contrast) / CYCT (CT with contrast)	電腦斷層掃描-不注射/注射顯影劑
MRI(magnetic resonance imaging)	核磁共振攝影
CXR (Chest x-ray)	胸部 X 光
KUB(Kidney、Ureter、 Bladder)	腎、輸尿管、膀胱 X 光
Bronchoscope	支氣管鏡

PFT (pulmonary function Test)	肺功能檢查
VATs (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery)	影像輔助式胸腔鏡手術
CV-echo	心臟超音波
EKG (electrocardiogram)	心電圖
Holter EKG	24 小時心電圖
Complete EKG	十二導程心電圖
T L-201 Myocardial Scan	鉍-201 心肌灌注顯像檢查
CATH(Catheterization)	心導管
Angiography	血管攝影
PVR(pulse volume recorder)	動脈分段血流及壓力測定
Quantitative thermal threshold	神經功能溫度閾值測定
NCV (nerve conduction velocity)	神經傳導速度
Liver biopsy	肝臟切片
ERCP(Endoscopic retrograde cholangiopancreatography)	逆行性膽胰攝影術
PTCD (percutaneous transhepatic cholangiodrainage)	經皮穿肝膽道攝影及引流術
LC (Laparoscopic Cholecystectomy)	腹腔鏡膽囊切除術
PES (panendoscopy)	消化道內視鏡檢查
ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)	經內視鏡逆行性膽胰管攝影術
PTCD (Percutaneous Transhepatic Cholangial Drainage)	經皮穿肝膽道引流術
PTGBD(Percutaneous Transhepatic Gallbladder Drainage)	經皮穿肝膽囊引流術
Abdominal sonography (echo) / Abd sonogram	腹部超音波
Renal sonography (echo)	腎臟超音波
KUB (Kidney, Ureter, Bladder)	腎臟-輸尿管-膀胱攝影
IVP (Intravenous Pyelography)	靜脈內腎盂攝影
Ccr (creatinine clearance rate)	肌酸酐廓郭清率
RP(Retrgrade Pyelography)/AP(Antegrade Pyelography)	逆行性腎盂攝影 / 前行性腎盂攝影
D-J (double J) catheter insertion	雙 J 導管置放
PCN (Percutaneous nephrostomy)	經皮腎造瘻
ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)	體外震波碎石術
URSL (Uretero reno scopic Lithotripsy)	輸尿管腎臟鏡碎石術
TURP (Transurethral resection of the prostate)	經尿道前列腺切除術
Colonscopy	大腸鏡
Bone scan	骨骼掃描

八、8A 病房常見檢驗

CBC&DC

檢驗項目	正常範圍及單位	代表意義(請顯示過高及過低代表意義)
WBC 白血球計數	4.5-11 10^3 /ul (4,500-11,000 ul)	過高：細菌感染、白血病、緊張、懷孕、服用類固醇。 過低：病毒感染、造血功能障礙、自體免疫疾病。
RBC 紅血球計數	男 4.5-5.7 10^6 /ul 女 3.9-5.5 10^6 /ul (3,900,000-5,550,000 ul) (390 萬-550 萬 ul)	過高：真性多血症、緊張、燒傷、脫水、劇烈運動、住在高海拔、EPO 增加。 過低：出血(外傷、月經等)、溶血(Thalassemia、G-6-PD 缺乏等)、稀釋(採檢為靜脈注射之手臂)、製造不足(EPO 減少、Vit. B12、鐵、葉酸缺乏)。
Hb 血色素	男 14.0 - 18.0 g/dl 女 12-16 g/dl	過高：真性多血症、燒傷、脫水。 過低：白血病、貧血、營養不良、懷孕。
HCT 血比容	男 40-54 % 女 38-47 %	過高:多血症或脫水症 過低:有貧血
MCV 平均血球容積	79-100 fL	過高:紅血球過大，見於缺維他命 B12 和葉酸之貧血、巨紅血球症；口服避孕藥、停經婦女及老人 過低:紅血球較小，見於缺鐵性貧血、地中海型貧血以及慢性疾病造成之貧血
MCH 平均血球血色素	25.4-34.6 pg	過高：巨紅血球性、惡性貧血、急性出血、慢性疾病。 過低：巨紅血球性貧血、淺色性貧血、鉛中毒。
MCHC 平均紅血球血紅素濃度	30-37 g/dl	過高：正色素性貧血； 過低：低色素性貧血。
Platelet 血小板	150-400 10^3 /ul	過高：真性多血症、慢性白血病、慢性感染、脾切除、肺結核、癌症末期，一天中中午時最高。 過低：DIC、肝脾腫大、紫斑症、自體免疫疾病、Heparin 等藥物干擾。
Differential Count 白血球分類計數		
Neutrophil 嗜中性白血球	40-74 %	過高：可能是病毒或細菌感染、炎症或骨髓增殖症。 過低：可能有再生性不良貧血或藥物作用。
Lymphocyte 淋巴球	19-48 %	過高：病毒感染、淋巴性白血病、梅毒、甲狀腺毒症。 過低：免疫機能障礙、Hodgkin' s disease、腎衰竭、淋巴球減少症、淋巴球性白血病。
Monocyte 單核球	3.4-9 %	過高：病毒感染、細菌感染、骨髓增生性疾病、惡性淋巴瘤。

		過低：惡性貧血、淋巴球性白血症。
Eosinophil 嗜酸性白血球	0-7 %	過高：過敏反應、寄生蟲感染、皮膚病、惡性出血、癌症轉移。 過低：Cushing 症、腎上腺皮質過高、燒傷、休克。
Basophil 嗜鹼性白血球	0-1.5 %	過高：慢性骨髓性白血病、溶血性貧血、真性紅血球增多症、Hodgkin' s disease。 過低：癌症化療或放射線治療後、急性感染、壓力。

SMA 血液生化檢查

檢驗項目：	正常範圍及單位	代表意義(請顯示過高及過低代表意義)
Glucose(Fasting) 空腹血糖	70-105 mg/dl	低: 胰臟腺腫、肝病、腦下垂體低下症、副腎皮質低下等。 高: 糖尿病、慢性胰臟炎、Cushing 氏症候群等。 因血球會分解葡萄糖，全血在室溫中，葡萄糖濃度每小時會降低 7 - 10 %，故取得檢體後應儘速送檢，以防數值偽性降低。
Total Cholesterol 總膽固醇	<200 mg/dl	低: 嚴重肝病疾病、甲狀腺功能亢進、營養不良、嚴重燒傷等。 高: 原發性疾病(家族性高膽固醇血症) 續發性疾病(甲狀腺功能低下、未控制的糖尿病、腎病症候群、膽道阻塞、神經性厭食症)等。
Triglyceride 三酸甘油脂	<200 mg/dl	低: 甲狀腺亢進症、肝病吸收不良症候群、腎小球炎等。 高: 家族性高血脂症、糖尿病、動脈硬化症、甲狀腺機能低下、阻塞性黃膽、急慢性胰臟炎。
BUN 血液尿素氮	7-20 mg/dl	低: 肝衰竭、懷孕、肝不全、服用利尿劑等。 高: 大量攝取蛋白質、體內組織損傷、腎功能敗壞、腎不全、癌症、充血性心臟衰竭、脫水。
Creatinine 肌酸酐	0.7-1.2 mg/dl	低: 慢性腎絲球腎炎、膠原蛋白病、鉛中毒 高: 急慢性腎衰竭、胃機能障礙、尿酸腎結石、癌症、甲狀腺機能亢進、肢端肥大症、腎機能障礙
Uric Acid 尿酸	2.4-7 mg/dl	低: 腎臟發炎、服用利尿劑、鉛中毒 高: 痛風、尿酸性腎結石、潰瘍性結腸炎、白血病
Total Calcium 總鈣	8.4-10.2 mg/dl	低: 腎病、營養不良 高: 惡性腫瘤
Inorganic Phosphorus 無機磷	2.7-4.5 mg/dl	低: 骨鬆症、肺炎、Addison 氏症會降低 高: 慢性腎病
AST 天門冬胺酸轉氨酶 (GOT)	<40 U/L	低: 維生素 B6 缺乏症等。 高: 急性病毒性或中毒性肝炎、膽道阻塞、酒精性肝炎或肝硬化、心肌梗塞。
ALT 丙胺酸轉氨酶(GPT)	<35 U/L	低: 維生素 B6 缺乏症等。 高: 急性病毒性或中毒性肝炎、膽道阻塞、酒精性肝炎或肝硬化、心肌梗塞。
Alkaline P 鹼性磷酸酶 ALK-P	40-129 U/L	低: 磷酸酶過低症 高: 成長或骨骼發育期、阻塞性肝膽炎、骨頭疾病、骨癌、骨肉瘤、肝癌副甲狀腺功能亢進
Total Bilirubin (T-bil) 膽紅素總量	<1 mg/dl	低: 飯後、缺鐵性貧血。 高: 急慢性肝炎、肝硬化、膽道阻塞、溶血性疾病。
Total Protein(Blood) 總蛋白	6.4-8.3 g/dl	低: 腎病症候群、肝病、燒傷、營養不良。 高: 脫水、免疫球蛋白過多症。
Albumin 白蛋白	3.5-5.5g/dl	低: 肝硬化、營養不良、燒傷、腎病症候群。 高: 脫水、休克。
A/G Ratio 白蛋白/球蛋白比值	1.2-2.4	低: 肝病、腎病症候群、炎症、營養不良、骨髓瘤。 高: 脫水、營養過剩。

Direct Bilirubin (D-bil) 直接膽紅素	0-0.3 mg/dl	高:膽汁排泄障礙、肝病、膽道阻塞。
LDH 乳酸脫氫酶	135-225 U/l	低:服用大量維他命 c 高:心肌梗塞、肝病、腎病症候群、休克。
r-GT 膽道酵素	9-40 U/l	高: 肝膽疾病、胰臟炎、飲酒、心衰竭、藥毒性等
NA + 鈉	135-145 mol/l	低: 粘液性水腫、口炎性腹瀉。 高: 脫水、腎臟炎、鹼缺乏。
K + 鉀	3.5-5.0 mmol/l	低: 慢性腎炎、胰島素過多、嚴重腹瀉、鞣固酮過量。 高: 安迪生氏病、肺炎、尿毒。
Cl ⁻ 氯	98-107 mmol/l	低: 嘔吐、腹瀉、腎有障礙時 高: 嚴重脫水 (燒傷)、多尿症。
CRP C-反應蛋白 (C-Reactive Protein)	< 0.5 mg/dl	發炎的指標(急性期:發炎或組織壞死 14-26 小時出現) 高: 急性炎症、細菌感染、組織的破壞、惡性腫瘤等。
Ammonia 氨	30-70μg/dl	

尿液常規檢查

檢查項目	參考值	檢查意義
Sp.Gr.比重	1.005-1.030	值↑過高。糖尿病、脫水性/發熱性疾患、腎病症候群、急性腎功能不全少尿期。 值↓過低。多尿、急性腎功能不全多尿期、腎盂腎炎、水腎症、高血鈣症。
PH 酸鹼值	5-8	值↑過高。可能為細菌感染、慢性腎功能不全、嘔吐、呼吸性或代謝性鹼中毒。 值↓過低。糖尿病性酮酸毒症、脫水、代謝性或呼吸性酸中毒。
Pro 尿蛋白	陰性(-)	非生理性因素。如：激烈運動、過度疲勞、食用過多的肉類/嘌呤類(豆類、高湯)， 則可能是高血壓、腎病變、痛風等引起。
GLU 尿糖	陰性(-)	陽性：疑糖尿病，宜抽血檢查血糖。
KET 尿酮體	陰性(-)	陽性：糖尿病酮酸中毒、長期饑餓狀態，必要時作血糖檢查。
OB 尿潛血	陰性(-)	陽性：疑尿路結石或感染，女性如非生理期，請至醫院做泌尿系統方面檢查。鼓勵多喝開水。
NIT 硝酸鹽	陰性	陽性：尿道感染。
RBC 紅血球	0-5 /HPF	膀胱炎、腎炎、尿路結石、特定免疫性疾患或前列腺疾患常呈陽性。
WBC 白血球	0-5 /HPF	泌尿道感染，發炎常上升。
Epi cell 上皮細胞	0-5 /HPF	顯示泌尿系統上皮剝離情況，尤其泌尿道發炎時，常會增加。

糞便常規檢查

檢查項目	參考值	檢查意義
OB 糞便潛血反應	陰性	陽性：疑消化道有出血情形。食用富含鐵食物，如：豬血、豬肝、鐵劑、牛、豬肉等，易有偽陽性產生。
Parasite 寄生蟲卵篩檢	陰性	陽性：有寄生蟲寄生。

九、8A 病房常見護理技術

名稱	名稱	考試重點
Vital signs	生命徵象	正常值範圍。測耳溫方向。測脈搏部位與方式。壓脈袋放置位置、綁帶鬆緊原則。
IV drip	點滴加藥	三讀五對、大量點滴量及 IV 加藥滴注時間計算
Insulin injection	胰島素注射法	部位、下針角度、深度
IM injection	肌肉注射法	部位、下針角度、深度
SC injection	皮下注射法	部位、下針角度、深度
One touch	血糖測量	血糖正常值 AC /PC (需寫單位) ※速記法：7-8-9-10 正常人 - AC：70-100 mg/dl； PC：80-140m g/dl 糖尿病 - AC：90-130 mg/dl； PC：100-140m g/dl
On foley	插尿管	目的、消毒方法、確認插對部位、男女固定位置
PP care	會陰沖洗	目的、水溫、臥位、清潔步驟、水柱方向
NG feeding	鼻胃管灌食	臥位、溫度、反抽量、灌食量、灌食高度、禁忌、灌食前後水量
NG care	鼻胃管護理	目的、轉 90 度、檢視鼻孔內外皮膚、換位貼、貼撕的方法
Glycine Enema	甘油灌腸	目的、潤滑、臥位
Change ice pillow	更換冰枕	目的、排氣、檢視漏水
CD(Change dressing) (Pig-tail、PEG care、 Trach.CVP、PTCD、PTGBD、 CATH、Pressure sore....)	換藥	目的、消毒方式、消毒直徑、貼膠布方向
Steam inhalation	蒸汽吸入	目的、臥位、進食前後時間、注意事項
I/O	輸入輸出	目的、輸入輸出不同磅秤、內容
Blood Transfusion	輸血	目的、各血品、量測 V/S、輸血異常反應
Suction	抽痰	目的、壓力、抽吸時間、禁忌症、缺氧徵象
Chest percussion	胸腔物理治療	目的、適應症、禁忌症、扣背手勢、部位
Change position.Percussion	翻身.扣背	

十、8A 病房常用醫療儀器

1. 耳溫槍・血糖機 2. 血壓計/血氧機 3. 亞培點滴幫浦 (IV pump) 4. 烤燈 5. 壁上抽痰器
6. 十二導程心電圖 7. 生理監視器/血壓血氧監視器 8. 電擊器 9. 紫外線燈

十一、8A 病房實習時間分配表

時間	工作內容
0715-0730	測生命徵象+問睡、痛、大便次數前一日 7AM-今天 7AM，若有異常報告負責學姐
0730-0750	交班/備藥/對藥
0750-0830	備藥/對藥(與老師)
0830-0900	對藥/給藥(與負責之學姐)
0900-1100	1. 整理病人單位如床旁桌之整體 2. 執行每日常規治療： (1) 完成 CAS、高跌評估、疼痛評估……及收集個案資料書寫護理記錄 (2) 更換各種到期管路如：IV bag、Foley (3) 協助病人送檢前準備及檢查前後監測 (4) 依病人狀況給予相關衛教（可列印護理指導單） (5) 與個案會談及執行身體評估並執行護理計畫 (6) 床邊 care：換藥、鼻胃管及尿管護理、翻身拍背、身體清潔、鼻胃管灌食、協助病人上下床…等）
1030-1040	測午餐前血糖後，輸入 NIS 系統
1100-1130	1. 測量生命徵象並導入 NIS，若有異常報告負責學姐 2. 先與老師備藥/對藥，再與學姐對藥/給藥 3. 午餐前需做交班
1130-1230	1. 可分梯午餐→留守需注意病房情況與紅燈 2. 協助需要 NG feeding 的個案
1300-1430	1. 隨時觀察所屬病人 IV 及需求或不適等，有異常報告負責學姐 2. 執行臨時治療 3. 完成書寫護理紀錄、學習日誌及各項交班紀錄與老師交班 4. 統計 I/O
1430-1530	1. 開會(個案照護討論、學習評量及實習作業進度討論) 2. 藥物/各項隨堂考

十二、8A 病房常規

(一)單位使用耳溫槍測量體溫。

(二)靜脈留置針頭及 IV bag 每三天更換一次，bag 與注射部位貼彩紅數字。

(三)遵守內外科無菌技術，嚴格執行接觸個案前後必須正確洗手，到病人單位需配戴外科口罩；針頭不回套。

(四)護理照護模式採主護及成組護理。

1. 白班上班時間：0730-1530。

2. 資訊化的護理記錄方式以 SOAPIE 或敘述性護理記錄為主。

3. 同學需參與病房個案討論。

4. 病房意外事件預防措施（用藥安全、跌倒、輸血等）。

5. 垃圾分類標準。

6. 針扎事件預防及處理標準。

7. 入院護理標準。入院護理：量身高、體重、體溫、脈搏、呼吸、血壓、確認病人並帶上手圈、填病人權利與義務聲明（護理人員及病人或家屬簽名）、填寫住院護理評估單、出院準備服務篩檢表、完成護理計畫表、KEY IN 入院護理記錄、環境介紹、完成病歷、診斷牌、床頭卡、陪伴證。

8. 每三天到期更換物品：留置針、IV bag。

9. 14 天或依醫囑決定：N-G tube、Foley tube 及 Foley bag。

10. 一個月更換物品：矽質的 N-Gtube 及 Foley tube。

11. 不建議定期更換：CVP。

12. qd : 9 bid : 9-17 tid : 9-13-17 qid : 9-13-17-21 q8h : 1-9-17
q6h : 6-12-6-12 tid/ac : 7' -11' -16' qd/ac : 7'
bid/ac : 7' -16' qid/ac : 7' -11' -16' -21

13. 白班 I/O 記錄時間是 7AM-3PM，統計後需輸入 NIS。

14. 有 Foley 的病人，每日需評估 BUNDLE CAE，每天三班與大便後需會陰清潔。

15. 住院期間病人需用尿壺請家屬自備。

(五). 出院護理：

(1) 需確認醫囑 月/日 MBD，月/日 OPD F/U。

(2) 出院藥物指導，包括：床號、姓名、藥名、劑量、時間、途徑、總包數正確係由藥師。詳細告知主要照顧者。

(3) 掛好號之門診預約單、診斷書交給家屬。

(4) 察看個案身上之靜脈留置針是否已拔除，並將手圈取下，同時提醒家屬將用物帶回。

(5) 完成出院護理紀錄：評估 D00，在每日評估-「特殊交班」事項內註記 MBD 時間，健康問題壓上 DC 日期，並完成出院護理紀錄。

(7) 拆除單位之被單丟污衣桶，耳溫套膜丟感染垃圾。

(8) 清潔人員擦拭單位後再鋪床。

十三、實習注意事項

1. 上班時間：白班 07:30~15:30，請提早到護理站瞭解個案相關資料。
2. 服裝儀容：
 - (1) 依學校規定穿著實習制服、白色護士鞋及白色短襪，配戴名牌、臂章，冬天可在制服內加穿白色禦寒衣物或統一之外套。
 - (2) 頭髮須整潔、**長髮請盤起、流海夾起**。
 - (3) 指甲剪短、勿擦指甲油、勿戴手環、手鍊、戒指。注意服裝儀容，一次不合格扣實習成績 1 分。
3. 攜帶用物：實習手冊、實習計畫、技術經驗小冊、空白藥卡、貼紙、紅藍黑原子筆、鉛筆、短尺、橡皮擦、聽診器、**有秒針的手錶**、計算機、小筆記本(能置口袋為原則)、小水杯、簡歷(格式詳見本說明最末頁，並請於實習第一天上班時交給單位護理長)。
4. 複習內外科護理學及 SOAP 之護理記錄書寫。
5. 切勿遲到(白班 7:30)，遲到補班依實習手冊規定辦理，並依情形斟酌扣實習成績，遲到 4 次者予停實習。
6. **實習期間勿隨意請假，若實習當天無法準時到達或欲請假，請在上班前(白班 7:15 前)親自以電話告知老師，嚴禁私下請同學轉達或以傳簡訊方式，違者以曠班論。請假若未補班，依實習規則每日扣實習總成績 5-10 分。**
7. **作業須事先列印切勿在病房列印，勿遲交，遲交者依實習規定扣實習成績。**
8. **執行所有治療均須有醫囑，且須與老師或學姊確認醫囑後才可執行，護生不可接口頭醫囑，但若有特殊情況須先行向老師報備。**
9. **備藥前需寫好藥卡，包括藥物作用、機轉、副作用、注意事項，並瞭解個案用藥原因。給藥時嚴格遵守三讀五對原則，並且先與老師核對再與學姊核對，8A 病房規定給藥由學姊(老師)與護生一起到病人單位給藥。**
10. 給藥時須協助病人服藥，確定病人服完藥後才可離開病人單位，若家屬表示等會才服用，請將藥物攜回，稍後再去給藥，不可留置桌上。
11. **首次執行的技術須在老師或學姐的督導下執行，護生在未通過老師評核前，不可私自以病人為練技術的對象，違者立即停實習。**
12. **護生只作衛教、藥物作用及副作用之說明及說明疾病名稱，不解釋病情及預後。**
13. 請照顧好自己病人的安全，隨時將床欄拉起，切勿讓病人跌落床下。
14. 寫記錄先打草稿，經老師及學姐指導後，再謄寫。
15. 嚴禁在護理站群聚聊天或嘻鬧，經發現而勸導不聽者即予停實習，若身體不適可先向老師報備，老師視情況協助妳就醫或暫時休息。

16. 注意禮節，態度莊重，做事謹慎，說話音量放低，對個案要有責任心多探視個案，治療時須陪伴在旁，多主動學習，若有任何問題隨時向老師或學姊反應，勿擅自處理。
17. 把握學習機會，並且主動幫忙分擔簡單不具侵入性的護理活動，如：鋪床、接聽電話、護士呼叫鈴、check V/S 及協助病人更衣...等。
- 18. 不可將病歷相關資料帶出護理站，copy 文件須經護理長同意才可 copy，嚴禁 copy 病歷或護理記錄。**
19. 若送病人檢查等需要離開單位，事前需向老師報告，返回並告訴老師。
20. 護生若有懷孕情況請告訴老師、同學及工作團隊，隨時留意環境之輻射線注意自身安全。
- 21. 上班時，不得滑手機、不可拍照。**

姓 名		日期
聯 絡 電 話		
Email address		

親愛的同學們：

我是蕭蘭芳 護理長，歡迎大家來到 8A 實習，祝福各位在接下來的四個星期能夠平安、順利、充實且愉快！為了幫助護理長能夠儘快的認識妳們，並且在實習指導上更能照顧到大家的需求，以下有一些問題要麻煩大家填寫，妳們所寫的內容僅作為老師教學上的參考，除此之外將完全保密，絕不會影響到妳的實習成績，請放心將妳心中的話說出來，謝謝！

@請描述一下妳的家庭狀況：

@妳覺得妳是怎樣的人？自覺有哪些優點與缺點？

@以往的實習經驗如何？(如：愉快與否？適應力如何？是否壓力過大或過小？)

@在這一站，妳希望老師如何幫助妳學習與適應？

@還有哪些妳想跟老師說而上面的問題沒有提到的？

