尖銳物品扎傷一般處理流程

被針頭等尖銳物品刺傷或割傷時

↓

1.立刻擠壓傷口處血管使血流出

↓

2.再流動水下清洗傷口五分鐘

黏膜與病患之血液體接觸時

↓

1.口腔:以流動清洗

↓

2.眼睛以流動水或 0.9%生理食鹽水沖洗

向實習老師及單位主管報備並填寫真傷報告表

↓

詳查病患抗原及抗體

↓

Anti-HIV、Anti-HBc、Anti-HBs、HBsAg、Anti-HCV、VDRL

↓

以上各項若有不明者，應立即抽血檢查

↓

病患
HIV(+)

↓

學生抽血檢查
Anti-HIV
可先服用
AZT200mg
(並照會專家)

↓

扎傷後
六週
三個月
六個月
定期追蹤

Anti-HIV

病患
HbsAg(+)或 HbsAg(-)，anti-HBs(-)，anti-HBs(+)

↓

學生如 HbsAg
anti-HBS
情形不明
立即抽血檢查

↓

學生
HbsAg(+)
或
anti-HBS(+)

↓

不需注射疫苗
或 HBIC

學生
HbsAg(-)
anti-HBS(-)
未注射疫苗

↓

24 小時內注射
HBIG 並接受
HBV 疫苗注射

學生
HbsAg(-)
anti-HBS(-)
已完成疫苗
注射未產生抗體

↓

24 小時內注射
HBIG 補一劑
疫苗

學生
HbsAg(-)
anti-HBS(-)
正接受疫苗
位產生抗體

↓

24 小時內注射
HBIG 繼續完成疫苗
注射

病患
anti-HCV(+)

↓

學生抽血檢驗

學生 anti-HCV(+)
繼續追蹤肝功能
GOT、GPT

學生 anti-HCV(-)
扎傷後三個月抽
anti-HCV、GPT

病患
VDRL(+)
TPHA>1：80

↓

penicillin 預防注射